

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 7

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

29/08/2022 - 04/09/2022










COMPRESORIO - CT - AREA ETNA NORD-EST

CASTIGLIONE DI SICILIA
MANIACE
RANDAZZO

| STADIO FENOLOGICO | CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA) | OLIVE INFESTATE % | SOGLIA DI INFESTAZIONE | TENDENZA | LIVELLO DI CRITICITA' |
|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| INGROSSAMENTO FRUTTI | 11 | 2 | 10% | MIGLIORAMENTO | BASSO |

PREVISIONI METEO

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 29/08/2022 | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 03/09/2022 | 04/09/2022 |

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Fine settimana caratterizzato da precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui comprensori della Sicilia Orientale.

Le condizioni climatiche favorevoli hanno provocato la ripresa delle ovideposizioni anche se non in tutti i punti di monitoraggio. Nonostante questo, l'infestazione attiva si mantiene bassa e al di sotto dei valori soglia anche grazie alla elevata mortalità delle giovani larve.

L'infestazione dannosa dovuta alla prima generazione, è molto bassa (compresa tra 1 e 5%), nonostante in alcuni oliveti, l'attacco alle olive sia stato elevato.

Consigli per gli olivicoltori:

Chi esegue trattamenti preventivi (adulterici), con rame, caolino, dispositivi mass trapping o esche tipo Spintor fly o Exirel® Bait 2022 deve eseguire il trattamento entro la fine della settimana.

Chi esegue trattamenti curativi (larvicidi) ed ha un'infestazione attiva al di sotto del 5-10% deve ritenersi in allerta e attendere il bollettino della prossima settimana.